

REMSIMA[®] SC
(influximabe)

Celltrion Healthcare Distribuição de
Produtos Farmacêuticos do Brasil Ltda.

Solução injetável
120 mg

IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO

REMSIMA® SC
infliximabe

APRESENTAÇÕES

REMSIMA® SC 120 mg solução injetável na seringa preenchida

- 1 seringa preenchida com 2 envelopes com lenço umedecido em álcool;
- 2 seringas preenchidas com 2 envelopes com lenço umedecido em álcool;
- 4 seringas preenchidas com 4 envelopes com lenço umedecido em álcool.

REMSIMA® SC 120 mg solução injetável na seringa preenchida com protetor de agulha

- 1 seringa preenchida com protetor de agulha e 2 envelopes com lenço umedecido em álcool;
- 2 seringas preenchidas com protetor de agulha e 2 envelopes com lenço umedecido em álcool;
- 4 seringas preenchidas com protetor de agulha e 4 envelopes com lenço umedecido em álcool.

REMSIMA® SC 120 mg solução injetável na caneta aplicadora

- 1 caneta aplicadora com 2 envelopes com lenço umedecido em álcool;
- 2 canetas aplicadoras com 2 envelopes com lenço umedecido em álcool;
- 4 canetas aplicadoras com 4 envelopes com lenço umedecido em álcool.

USO SUBCUTÂNEO

USO ADULTO

COMPOSIÇÃO

Remsima® SC 120 mg solução injetável na seringa preenchida (com protetor de agulha)

Cada seringa preenchida de dose única com 1 mL contém 120 mg de infliximabe*.

Remsima® SC 120 mg solução injetável na caneta aplicadora

Cada caneta aplicadora de dose única com 1 mL contém 120 mg de infliximabe*.

* Infliximabe é um anticorpo monoclonal quimérico IgG1 humano-murino produzido em células de hibridomas murinos por tecnologia de DNA recombinante.

Excipientes: ácido acético, acetato de sódio trihidratado, sorbitol, polissorbato 80 e água para injeção.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

As informações disponíveis nesta bula aplicam-se exclusivamente a **Remsima® SC**.

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

REMSIMA® SC é um medicamento usado para tratar pacientes adultos com doença de Crohn, com colite ou retocolite ulcerativa, pacientes adultos com doença de Crohn fistulizante, artrite reumatoide, espondilite anquilosante, artrite psoriásica e psoríase em placa. Nessas doenças, o corpo produz uma quantidade maior de uma substância chamada fator de necrose tumoral alfa (TNF-alfa). Essa quantidade maior de substância faz com que o sistema imunológico do seu corpo ataque o tecido saudável causando uma inflamação. Bloquear o TNF-alfa com **REMSIMA® SC** pode reduzir a inflamação, mas pode também diminuir a capacidade do seu sistema imunológico em combater infecções. O seu médico decidiu tratá-lo com **REMSIMA® SC** porque sua doença ainda está ativa, mesmo que você tenha tentado outros tratamentos.

Artrite Reumatoide

A artrite reumatoide é uma doença inflamatória das articulações. Se você tem artrite reumatoide de moderada a gravemente ativa, será tratado com **REMSIMA® SC** associado ao metotrexato para:

- reduzir os sinais e sintomas da sua doença;
- prevenir as lesões nas articulações;
- melhorar a função física.

Espondilite Anquilosante

A espondilite anquilosante é uma doença inflamatória da coluna. Caso tenha espondilite anquilosante, e não responda ou tolere outros medicamentos, você receberá **REMSIMA® SC** para:

- reduzir os sinais e sintomas de sua doença, incluindo amplitude de movimento;
- melhorar a função física.

Artrite Psoriásica

A artrite psoriásica é uma doença inflamatória das articulações, frequentemente acompanhada por psoríase. Caso tenha artrite psoriásica ativa que não responde a outros medicamentos, você receberá **REMSIMA® SC** para:

- reduzir os sinais e sintomas da sua artrite, incluindo redução da dor e inchaço em torno das suas articulações;
- melhorar a psoríase;
- melhorar a função física.

Psoríase em placa

A psoríase em placa é uma doença inflamatória da pele. Se você tiver psoríase em placas de moderada a grave, e o tratamento sistêmico por fototerapia ou convencional tem sido inadequado ou inapropriado, você receberá **REMSIMA® SC** para:

- reduzir os sinais e sintomas da sua psoríase;
- melhorar sua qualidade de vida.

Doença de Crohn

A doença de Crohn é uma doença inflamatória intestinal. Se você tem a doença de Crohn moderada ou grave que está ativa e não responde a outros medicamentos, você receberá **REMSIMA® SC** para:

- reduzir os sinais e sintomas de sua doença;
- induzir e manter a remissão (estágio sem sintomas) de sua doença;
- induzir a cicatrização do tecido intestinal;
- melhorar sua qualidade de vida, ajudando-o a se sentir melhor;
- reduzir o número de drenagens de fístulas (abertura anormal através da pele a partir do intestino).

Colite ou Retocolite Ulcerativa

A colite ou retocolite ulcerativa é uma doença inflamatória do intestino. Caso tenha colite ou retocolite ulcerativa de moderada a grave que está ativa e não responde a outros medicamentos, você receberá **REMSIMA® SC** para:

- reduzir os sinais e sintomas de sua doença;
- induzir e manter remissão de sua doença;
- induzir e manter a cicatrização da mucosa;
- reduzir ou eliminar o uso de corticosteroides;
- melhorar sua qualidade de vida, ajudando-o a se sentir melhor;
- reduzir a necessidade de remover o intestino grosso.

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

REMSIMA® SC tem como objetivo reduzir a atividade inflamatória. O ingrediente ativo, infliximabe, é um anticorpo monoclonal quimérico humano-camundongo. Anticorpos monoclonais são proteínas que reconhecem e se ligam a outras proteínas específicas. O infliximabe se liga fortemente a uma proteína especial no corpo chamada Fator de Necrose Tumoral alfa ou TNF-alfa, envolvida com a inflamação. O aumento da quantidade de TNF-alfa é comum em doenças inflamatórias, como: artrite reumatoide, doença de Crohn, colite ou retocolite ulcerativa, espondilite anquilosante, artrite psoriásica e psoríase em placa.

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Este medicamento é contraindicado para uso por pessoas que tenham:

- alergia ao **REMSIMA® SC** ou qualquer outro componente do produto (ácido acético, acetato de sódio trihidratado, sorbitol, polissorbato 80 e água para injeção);
- alergia a proteínas de camundongos (murinas);
- uma infecção que está sendo tratada. Se você tem ou pensa que pode ter uma infecção, pergunte ao seu médico se é um tipo de infecção que poderia levar ao aparecimento de eventos adversos graves de **REMSIMA® SC**;
- insuficiência cardíaca, pois você pode não ser um candidato para o tratamento com **REMSIMA® SC**. Seu médico irá decidir se você deve receber **REMSIMA® SC**.

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Antes de receber o tratamento com **REMSIMA® SC**, você deve informar ao seu médico se:

- tem uma infecção que não passa ou uma história de infecção recorrente.

- teve tuberculose (TB), ou se, recentemente, você esteve em contato com alguém que possa ter TB. O seu médico irá examiná-lo e realizar um teste de pele. Se o médico achar que você corre o risco de ter TB, ele poderá iniciar um tratamento para TB antes de iniciar o tratamento com **REMSIMA® SC**.
- você viveu ou viajou para uma área onde as infecções chamadas histoplasmose, coccidioomicose ou blastomicose são comuns. Essas infecções são causadas por fungos que podem afetar os pulmões ou outras partes de seu corpo. Se você não sabe se essas infecções são comuns na área onde viveu ou viajou, pergunte ao seu médico.
- tem insuficiência cardíaca ou já teve ou atualmente tem alguma doença cardíaca. Se você apresentar novos ou agravamento dos sintomas de insuficiência cardíaca, tais como falta de ar ou inchaço dos pés, você deve informar ao seu médico.
- tem ou teve uma condição que afeta o sistema nervoso, como esclerose múltipla, síndrome de Guillain-Barré, ou convulsões, ou se tiver sido diagnosticado com neurite óptica. Você deve informar ao seu médico se sentir dormência, formigamento, distúrbios visuais ou convulsões.
- recebeu recentemente ou está programado para receber uma vacina.
- Se você tiver um bebê durante o tratamento com **REMSIMA® SC**, informe ao pediatra que você está usando **REMSIMA® SC** antes do bebê receber qualquer vacina, incluindo vacinas de vírus vivos, como BCG (usada para a prevenção de tuberculose). Para maiores informações veja os itens relacionados à Gravidez e Amamentação.
- recebeu recentemente ou se estiver programado para receber tratamento com um agente terapêutico infeccioso (tal como instilação de BCG, usada para o tratamento de câncer).

Gravidez

Informe ao seu médico se você está grávida, planeja engravidar ou se está amamentando. Se você tiver um bebê durante o tratamento com **REMSIMA® SC**, é importante informar ao pediatra e a qualquer outro médico, que você está usando **REMSIMA® SC**, para que ele possa então decidir quando o seu bebê deverá receber vacinas.

Se você recebeu **REMSIMA® SC** enquanto estava grávida, o seu bebê pode ter um risco aumentado de contrair uma infecção. Antes de seu bebê receber qualquer tipo de vacina é importante informar o pediatra e outros profissionais da saúde, que você faz uso de **REMSIMA® SC**. A administração de vacina BCG dentro de 6 meses após o nascimento do bebê, de mães que receberam **REMSIMA® SC** enquanto estavam grávidas, pode resultar em infecção em recém-nascidos com complicações graves, incluindo morte. Para outros tipos de vacina, discuta com seu médico.

Também foi relatada diminuição grave no número de células brancas do sangue em bebês de mulheres tratadas com **REMSIMA® SC** durante a gravidez. Se seu bebê tiver febre ou infecções persistentes, contate o pediatra imediatamente.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

Amamentação

Não se sabe se **REMSIMA® SC** é excretado no leite humano. Caso você esteja amamentando ou planejando amamentar, converse com seu médico sobre a descontinuação do tratamento com **REMSIMA® SC** ou a interrupção da amamentação.

Uso em crianças

REMSIMA® SC não é recomendado para pacientes com idade inferior a 18 anos e não há dados disponíveis. Portanto, **REMSIMA® SC** é recomendado apenas para uso em adultos.

Uso em idosos

Não foram conduzidos estudos específicos de infliximabe em pacientes idosos. Em estudos clínicos não foram observadas diferenças importantes na depuração ou no volume de distribuição relacionadas à idade. A incidência de infecções graves nos pacientes com idade ≥ 65 anos tratados com infliximabe foi maior do que nos pacientes com idade inferior a 65 anos. Além disso, existe maior incidência de infecções na população de idosos em geral, e por isso, recomenda-se cautela ao tratar pacientes idosos.

Efeitos sobre a capacidade de dirigir veículos e operar máquinas

REMSIMA® SC tem pouca probabilidade de afetar a capacidade de dirigir veículos ou operar máquinas. No entanto, pacientes com fadiga devem ser alertados para evitar tais atividades.

Medicamentos imunossupressores podem ativar focos primários de tuberculose. Os médicos que acompanham pacientes sob imunossupressão devem estar alertas quanto à possibilidade de surgimento de

doença ativa, tomando, assim, todos os cuidados para o diagnóstico precoce e tratamento.

Ingestão concomitante com outras substâncias

A combinação de **REMSIMA® SC** com outro biológico utilizado para tratar as mesmas condições que **REMSIMA® SC**, incluindo anacina e abatacepte, não é recomendada.

Foi demonstrado que a formação de anticorpos contra infliximabe é reduzida em pacientes com doença de Crohn, artrite psoriásica e artrite reumatoide quando administrado concomitantemente ao metotrexato e outros imunomoduladores. Não há informações disponíveis em relação a possíveis efeitos de outros imunossupressores sobre a farmacocinética do infliximabe.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento. Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Conservar **REMSIMA® SC** sob refrigeração (entre 2°C e 8°C). Não congelar.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

Aspecto físico

REMSIMA® SC é uma solução que é de transparente a opalescente, incolor a castanho claro. Não use se a solução estiver turva, descolorida ou contiver partículas visíveis.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Mode de uso:

Instruções para preparo e administração de Remsima® SC 120 mg (infliximabe) seringa preenchida para uso de 120 mg/1,0 mL:

As seguintes instruções explicam como realizar a aplicação subcutânea da seringa preenchida para uso de **Remsima® SC** (infliximabe). Leia atentamente as instruções e siga-as passo a passo. Você deverá ser instruído por seu médico, enfermeiro ou farmacêutico quanto à técnica correta de autoaplicação.

Não aplique o medicamento até que você tenha segurança de que compreendeu corretamente as instruções. Após receber treinamento adequado, o paciente e/ou responsável, por exemplo, um membro da família pode realizar a aplicação da seringa preenchida para uso de **Remsima® SC** (infliximabe). Use a seringa preenchida para uso de **Remsima® SC** (infliximabe) para apenas uma aplicação. Você deverá utilizar **Remsima® SC** (infliximabe) por todo o período indicado por seu médico. Os locais de injeção devem ser alternados a cada aplicação.

Não use se os selos de segurança da caixa estiverem danificados ou ausentes.

Leia atentamente estas instruções antes de utilizar **REMSIMA® SC**. Consulte o seu prestador de cuidados de saúde se tiver dúvidas sobre como utilizar **REMSIMA® SC**.

Informação importante

- Utilize a seringa **APENAS** se o seu profissional de saúde deu informação sobre a forma correta de preparar e administrar uma injeção.
- Pergunte ao seu profissional de saúde com que frequência vai ter de administrar a injeção.
- Mude o local de injeção sempre que administrar uma injeção. Cada novo local deve estar a, pelo menos, 3 cm de distância do local de injeção anterior.
- **Não** utilize a seringa se esta tiver caído ou tiver danos visíveis. Uma seringa danificada poderá não funcionar corretamente.
- **Não** reutilize a seringa.
Não agite a seringa em circunstância alguma.

REMSIMA® SC 120 mg solução injetável em seringa preenchida
Partes da Seringa (veja Figura A)




Figura A

Não retire a tampa até estar pronto para injetar. Assim que retirar a tampa, **não** volte a tapar a seringa.

Prepare-se para a injeção

1. Junte os materiais para a injeção.

- Prepare uma superfície limpa e plana, tal como uma mesa ou bancada, em uma área bem iluminada.
- Retire a seringa da embalagem conservada no refrigerador segurando pelo meio do corpo da seringa.
- Certifique-se de que tem os seguintes materiais:

- Seringa;
- Lenço umedecido em álcool;
- Bola de algodão ou gaze*;
- Curativo adesivo*;
- Recipiente para perfurocortantes*

**Itens não incluídos na embalagem.*

2. Inspeção a seringa

Não use a seringa se:

- Estiver rachada ou danificada.
- O prazo de validade tiver expirado

3. Inspeção o medicamento (veja Figura B).

O líquido deve ser límpido e incolor a marrom claro. **Não** use a seringa se o líquido estiver turvo, descolorido ou contiver partículas.

Nota: poderá haver bolhas de ar no líquido. Isso é normal.




Figura B

4. Aguarde 30 minutos.

a. Deixe a seringa em temperatura ambiente por 30 minutos para permitir que aqueça naturalmente.

Não aqueça a seringa usando fontes de calor como água quente ou micro-ondas.

5. Escolha o local da injeção (consultar Figura C).

a. Selecione o local da injeção. Pode injetar:

- Na parte da frente das coxas.
- No abdômen, exceto nos 5 cm à volta do umbigo.
- Na zona de fora dos braços (profissionais de saúde APENAS).

Não injete na pele que está a 5 cm do seu umbigo, ou em uma parte que esteja sensível, ferida, machucada ou com cicatriz.

Nota: mude o local da injeção de cada vez que aplica uma injeção. Cada novo local de injeção deve estar a, pelo menos, 3 cm de distância do local de injeção anterior




Figura C

6. Lave as mãos.

a. Lave as mãos com água e sabão e seque-as bem.

7. Limpe o local de injeção.

a. Limpe o local de injeção com um lenço umedecido em álcool.

b. Deixe a pele secar antes de injetar.

Não sopre ou toque novamente no local de injeção antes de administrar a injeção.

Administre a injeção

8. Retire a tampa (veja Figura D).

a. Retire a tampa a direito.

Não toque na agulha. Se o fizer poderá causar uma lesão por picada de agulha.




Figura D

9. Insira a agulha no local de injeção (veja Figura E).

- a. Segure na seringa pelo corpo com uma mão, entre o polegar e o indicador.
- b. Utilizando a outra mão, faça com cuidado uma prega na pele que limpou.
- c. Com um movimento rápido e “tipo dardo”, insira a agulha completamente na prega de pele em um ângulo de 45 graus.




Figura E

10. Administre a injeção (veja Figura F).

- a. Depois de a agulha estar inserida, solte a prega de pele.
- b. Empurre o êmbolo lentamente e até ao fim, até a seringa estar vazia.




Figura F

11. Retire a seringa do local de injeção (veja Figura G).

- a. Retire a agulha da pele no mesmo ângulo em que foi inserido.
- b. Pressione com suavidade o local de injeção com uma bola de algodão ou uma gaze e mantenha assim durante 10 segundos.
- c. Aplique um curativo adesivo, se necessário.

Não friccione o local de injeção.




Figura G

Depois da injeção

12. Elimine a seringa (veja *Figura H*).

- a. Coloque a seringa usada num recipiente para perfurocortantes imediatamente após a utilização.
- b. Se não tem um recipiente para perfurocortantes, pode utilizar um recipiente doméstico que:
 - seja feito de um plástico resistente;
 - possa ser fechado com uma tampa hermética, resistente a furos, donde seja impossível os cortantes saírem;
 - que fique na vertical e estável durante a utilização;
 - seja resistente a vazamento; e
 - esteja devidamente rotulado para alertar contra os resíduos perigosos no seu interior.
- c. Quando o seu recipiente para perfurocortantes estiver quase cheio, deve ser eliminado em conformidade com os requisitos locais.

Não volte a tampar a seringa.

Nota: manter a seringa e o recipiente para perfurocortantes fora da vista e do alcance das crianças.



Figura H

REMSIMA® SC 120 mg solução injetável em seringa preenchida com protetor de agulha
Partes da Seringa (veja Figura A)




Figura A

Não retire a tampa até estar pronto para injetar. Assim que retirar a tampa, **não** volte a tampar a seringa.

Prepare-se para a injeção

1. Junte os materiais para a injeção.

- Prepare uma superfície limpa e plana, como uma mesa ou bancada, em uma área bem iluminada.
- Retire a seringa da embalagem conservada no refrigerador segurando pelo meio do corpo da seringa.
- Certifique-se de que tem os seguintes materiais:

- Seringa;
- Lenço umedecido em álcool;
- Bola de algodão ou gaze*;
- Curativo adesivo*;
- Recipiente para perfurocortantes*

**Itens não incluídos na embalagem.*

2. Inspeção a seringa

Não use a seringa se:

- Estiver rachada ou danificada.
- O prazo de validade tiver expirado

3. Inspeção o medicamento (veja Figura B).

O líquido deve ser límpido e incolor a marrom claro. **Não** use a seringa se o líquido estiver turvo, descolorido ou contiver partículas.

Nota: poderá haver bolhas de ar no líquido. Isso é normal.




Figura B

4. Aguarde 30 minutos.

a. Deixe a seringa em temperatura ambiente por 30 minutos para permitir que aqueça naturalmente.

Não aqueça a seringa usando fontes de calor como água quente ou micro-ondas.

5. Escolha o local da injeção (veja Figura C).

a. Selecione o local da injeção. Pode injetar:

- Na parte da frente das coxas.
- No abdômen, exceto nos 5 cm em volta do umbigo.
- Na zona de fora dos braços (profissionais de saúde APENAS).

Não injete na pele que está a 5 cm do seu umbigo, ou em uma parte que esteja sensível, ferida, machucada ou com cicatriz.

Nota: mude o local da injeção cada vez que aplicar uma injeção. Cada novo local de injeção deve estar a, pelo menos, 3 cm de distância do local de injeção anterior




Figura C

6. Lave as mãos.

a. Lave as mãos com água e sabão e seque-as bem.

7. Limpe o local de injeção.

a. Limpe o local de injeção com um lenço umedecido em álcool.

b. Deixe a pele secar antes de injetar.

Não sopre ou toque novamente no local de injeção antes de administrar a injeção.

Administre a injeção

8. Retire a tampa (veja Figura D).

a. Retire a tampa.

Não toque na agulha. Se o fizer poderá causar uma lesão por picada de agulha.




Figura D

9. Insira a agulha no local de injeção (veja Figura E).

- a. Segure na seringa pelo corpo com uma mão, entre o polegar e o indicador.
- b. Utilizando a outra mão, faça com cuidado uma prega na pele que limpou.
- c. Com um movimento rápido e “tipo dardo”, insira a agulha completamente na prega de pele em um ângulo de 45 graus.




Figura E

10. Administre a injeção (veja Figura F).

- a. Depois de a agulha estar inserida, solte a prega de pele.
- b. Empurre o êmbolo lentamente e até ao fim, até a seringa estar vazia.




Figura F

11. Retire a seringa do local de injeção (veja Figura G).

- a. Depois de a seringa estar vazia, retire lentamente o polegar do êmbolo até a agulha estar completamente tampada pela proteção de agulha automática.
- b. Pressione com suavidade o local de injeção com uma bola de algodão ou uma gaze e mantenha assim durante 10 segundos.
- c. Aplique um curativo adesivo, se necessário.

Não friccione o local de injeção.




Figura G

Depois da injeção

12. Elimine a seringa (veja Figura H).

- a. Coloque a seringa usada num recipiente para perfurocortantes imediatamente após a utilização.
- b. Se não tem um recipiente para perfurocortantes, pode utilizar um recipiente doméstico que:
 - seja feito de um plástico resistente;
 - possa ser fechado com uma tampa hermética, resistente a furos, de onde seja impossível os cortantes saírem;
 - que fique na vertical e estável durante a utilização;
 - seja resistente a vazamentos; e
 - esteja devidamente rotulado para alertar contra os resíduos perigosos no seu interior.
- c. Quando o seu recipiente para perfurocortantes estiver quase cheio, deve ser eliminado em conformidade com os requisitos locais.

Não volte a tampar a seringa.

Nota: manter a seringa e o recipiente para perfurocortantes fora da vista e do alcance das crianças.



Figura H

Leia atentamente estas instruções antes de utilizar a caneta de **REMSIMA® SC**. Consulte o seu profissional de saúde se tiver dúvidas sobre como utilizar a caneta de **REMSIMA® SC**.

Informação importante

- Utilize a caneta **APENAS** se o seu profissional de saúde deu informações sobre a forma correta de preparar e administrar uma injeção subcutânea.
- Pergunte ao seu profissional de saúde com que frequência vai ter de administrar a injeção.
- Mude o local de injeção sempre que administrar uma injeção. Cada novo local deve estar a, pelo menos, 3 cm de distância do local de injeção anterior.
- **Não** utilize a caneta se esta tiver caído ou tiver danos visíveis. Uma seringa danificada poderá não funcionar corretamente.
- **Não** reutilize a caneta.
- **Não** agite a caneta em circunstância alguma.

Remsima® SC 120 mg solução injetável na caneta aplicadora
Partes da caneta (veja Figura A)




Figura A

Não retire a tampa até estar pronto para injetar. Assim que retirar a tampa, **não** volte a tampar a caneta.

Prepare-se para a injeção

1. Junte os materiais para a injeção.

- Prepare uma superfície limpa e plana, como uma mesa ou bancada, em uma área bem iluminada.
- Retire a seringa da embalagem conservada no refrigerador segurando pelo meio do corpo da seringa.
- Certifique-se de que tem os seguintes materiais:

- Caneta;
- Lenço umedecido em álcool;
- Bola de algodão ou gaze*;
- Curativo adesivo*;
- Recipiente para perfurocortantes*.

**Itens não incluídos na embalagem.*

2. Inspeção a caneta

Não use a caneta se:

- Estiver rachada ou danificada;
- O prazo de validade tiver expirado.

3. Inspeção o medicamento (veja Figura B).

O líquido deve ser límpido e incolor a marrom claro. **Não** use a seringa se o líquido estiver turvo, descolorido ou contiver partículas.

Nota: poderá haver bolhas de ar no líquido. Isso é normal.




Figura B

4. Aguarde 30 minutos.

a. Deixe a seringa em temperatura ambiente por 30 minutos para permitir que aqueça naturalmente.

Não aqueça a seringa usando fontes de calor como água quente ou micro-ondas.

5. Escolha o local da injeção (veja Figura C).

a. Selecione o local da injeção. Pode injetar:

- Na parte da frente das coxas.
- No abdômen, exceto nos 5 cm em volta do umbigo.
- Na zona de fora dos braços (profissionais de saúde APENAS).

Não injete na pele que está a 5 cm do seu umbigo, ou em uma parte que esteja sensível, ferida, machucada ou com cicatriz.

Nota: mude o local de injeção cada vez que aplicar uma injeção. Cada novo local deve estar a, pelo menos, 3 cm de distância do local de injeção anterior




Figura C

6. Lave as mãos.

b. Lave as mãos com água e sabão e seque-as muitíssimo bem.

7. Limpe o local de injeção.

c. Limpe o local de injeção com um lenço umedecido em álcool.

d. Deixe a pele secar antes de injetar.

Não sopre ou toque novamente no local de injeção antes de administrar a injeção.

Administre a injeção

8. Retire a tampa (veja Figura D).

a. Puxe a tampa verde oliva e coloque a parte.

Não toque no protetor de agulha. Se o fizer poderá causar uma lesão por picada de agulha.




Figura D

9. Insira a caneta no local de injeção (veja Figura E).

- a. Segure na caneta de forma a conseguir ver a janela.
- b. Sem fazer pregas ou esticar a pele, coloque a caneta por cima do local de injeção fazendo um ângulo de 90 graus.




Figura E

10. Inicie a injeção (veja Figura F).

- a. Pressione a caneta **com firmeza** contra a pele.

Nota: quando a injeção começa, irá ouvir o 1º “clique” e a haste do êmbolo verde oliva irá começar a preencher a janela.

- b. Continue a segurar a caneta **com firmeza** contra a pele e espere até ouvir o 2º “clique”.




Figura F

11. Termine a injeção (veja Figura G).

- a. Depois de ouvir o 2.º “clique”, **continue a segurar a caneta com firmeza contra a pele e conte lentamente até pelo menos cinco** para garantir que injetou a dose toda. Depois da seringa estar vazia, retire lentamente o polegar do êmbolo até a agulha estar completamente coberta pela proteção de agulha automática.




Figura G

12. Retire a caneta do local de injeção

- Olhe para a caneta e confirme que a haste do êmbolo verde oliva preenche a janela na totalidade. Coloque a seringa usada num recipiente para perfurocortantes imediatamente após a utilização.
- Retire a caneta do local de injeção (veja **Figura H**).
- Pressione com suavidade uma bola de algodão ou uma gaze no local de injeção e aplique um adesivo, se necessário.

Não friccione o local de injeção.

*Nota: após retirar a caneta do local de injeção, a agulha irá ser tampada automaticamente (veja **Figura I**).*

Nota: se a haste do êmbolo verde oliva não preencher a janela completamente, você não recebeu uma dose completa. Neste caso, não reutilize a caneta. Contacte imediatamente o seu profissional de saúde.





Figura H



Protetor de agulha

Figura I

Depois da injeção

13. Elimine a caneta (veja Figura J).

- Coloque a caneta usada num recipiente para perfurocortantes imediatamente após a utilização.
- Se não tem um recipiente para perfurocortantes, pode utilizar um recipiente doméstico que:
 - seja feito de um plástico resistente;
 - possa ser fechado com uma tampa hermética, resistente a furos, de onde seja impossível os cortantes saírem;
 - que fique na vertical e estável durante a utilização;
 - seja resistente a vazamentos; e
 - esteja devidamente rotulado para alertar contra os resíduos perigosos no seu interior.
- Quando o seu recipiente para perfurocortantes estiver quase cheio, deve ser eliminado em conformidade com os requisitos locais.

Não volte a tampar a caneta.

Nota: manter a caneta e o recipiente para cortantes fora da vista e do alcance das crianças.



Figura J

Posologia

Adultos (≥18 anos)

Artrite Reumatoide

O tratamento com **REMSIMA® SC** administrado por via subcutânea deve ser iniciado como terapia de manutenção 4 semanas depois da última administração de duas infusões intravenosas do infliximabe de 3 mg/kg dadas com um intervalo de 2 semanas. A dose recomendada para **REMSIMA® SC** é 120 mg uma vez a cada 2 semanas.

REMSIMA® SC deve ser administrado concomitantemente com metotrexato.

Os dados disponíveis sugerem que a resposta clínica geralmente é alcançada em 12 semanas de tratamento. A terapia contínua deve ser cuidadosamente reconsiderada para pacientes que não apresentem evidências de benefício terapêutico nas primeiras 12 semanas de tratamento.

Espondilite Anquilosante

O tratamento com **REMSIMA® SC** administrado por via subcutânea deve ser iniciado como terapia de manutenção 4 semanas depois da última administração de duas infusões intravenosas do infliximabe de 5 mg/kg dadas com um intervalo de 2 semanas. A dose recomendada para **REMSIMA® SC** é 120 mg uma vez a cada 2 semanas. Se um paciente não responder em 6 semanas (isto é, após 2 infusões intravenosas), não deve ser administrado nenhum tratamento adicional com o infliximabe.

Artrite Psoriásica

O tratamento com **REMSIMA® SC** administrado por via subcutânea deve ser iniciado como terapia de manutenção 4 semanas depois da última administração de duas infusões intravenosas do infliximabe de 5 mg/kg dadas com um intervalo de 2 semanas. A dose recomendada para **REMSIMA® SC** é 120 mg uma vez a cada 2 semanas.

Psoríase em placa

O tratamento com **REMSIMA® SC** administrado por via subcutânea deve ser iniciado como terapia de manutenção 4 semanas depois da última administração de duas infusões intravenosas do infliximabe de 5 mg/kg dadas com um intervalo de 2 semanas. A dose recomendada para **REMSIMA® SC** é 120 mg uma vez a cada 2 semanas. Se um paciente não mostrar resposta depois de 14 semanas (isto é, 2 infusões intravenosas e 5 injeções subcutâneas), não deve ser administrado nenhum tratamento adicional com o infliximabe.

Doença de Crohn ativa moderada a grave

O tratamento com **REMSIMA® SC** administrado por via subcutânea deve ser iniciado como terapia de manutenção 4 semanas depois da última administração de duas infusões intravenosas do infliximabe de 5 mg/kg dadas com um intervalo de 2 semanas. A dose recomendada para **REMSIMA® SC** é de 120 mg uma vez em 2 semanas. Se um paciente não responder depois de 2 doses de infusões intravenosas, não deve ser administrado nenhum tratamento adicional com o infliximabe. Os dados disponíveis não suportam tratamento com o infliximabe adicional em pacientes que não respondem dentro de 6 semanas após a infusão inicial.

Doença de Crohn ativa e fistulizante

REMSIMA® SC 120 mg dado como uma injeção subcutânea 4 semanas após a última administração de duas infusões intravenosas do infliximabe 5 mg/kg dadas com um intervalo de 2 semanas. A dose recomendada para **REMSIMA® SC** é 120 mg uma vez a cada 2 semanas. Se um paciente não responder depois de 6 doses (isto é, 2 infusões intravenosas e 4 injeções subcutâneas), não deve ser administrado nenhum tratamento adicional com o infliximabe.

Na doença de Crohn, a experiência com a readministração se os sinais e sintomas da doença se repetirem é limitada e faltam dados comparativos sobre o benefício/risco das estratégias alternativas para o tratamento continuado.

Colite e Retocolite Ulcerativa

O tratamento com **REMSIMA® SC** administrado por via subcutânea deve ser iniciado como terapia de manutenção 4 semanas depois da última administração de duas infusões intravenosas do infliximabe de 5 mg/kg dadas com um intervalo de 2 semanas. A dose recomendada para **REMSIMA® SC** é 120 mg uma vez a cada 2 semanas.

Os dados disponíveis sugerem que a resposta clínica geralmente é alcançada em 14 semanas de tratamento (isto é, 2 infusões intravenosas e 4 injeções subcutâneas). A terapia contínua deve ser cuidadosamente reconsiderada para pacientes que não apresentem evidências de benefício terapêutico durante esse período.

Readministração para doença de Crohn e artrite reumatoide

A partir da experiência com o infliximabe intravenoso, se os sinais e sintomas da doença reaparecerem, o infliximabe pode ser readministrado dentro de 16 semanas após a última administração. Dez pacientes com doença de Crohn manifestaram reações de hipersensibilidade tardia com a readministração de uma formulação alternativa do infliximabe depois de uma infusão prévia, após intervalo sem droga de 2 a 4 anos. É desconhecido o risco de hipersensibilidade tardia depois da readministração, em um intervalo sem droga de 16 semanas a 2 anos. Por isso, depois de um intervalo de 16 semanas, não se pode recomendar a readministração.

De acordo com a experiência com infliximabe intravenoso, se os sinais e sintomas da doença ocorrerem novamente, o infliximabe pode ser administrado novamente dentro de 16 semanas após a última administração.

Readministração para colite ou retocolite ulcerativa

No momento, não há dados disponíveis que suportem a readministração além de intervalos de 8 semanas.

Readministração para espondilite anquilosante

No momento, não há dados disponíveis que suportem a readministração além de intervalos de 6 a 8 semanas.

Readministração para artrite psoriásica

No momento, não há dados disponíveis que suportem a readministração além de intervalos de 8 semanas.

Readministração para psoríase em placa

A experiência de tratamento intermitente com o infliximabe intravenoso na psoríase em placa após um período sem tratamento sugere eficácia reduzida e incidência mais elevada de reações à infusão em comparação com a recomendação posológica aprovada.

Fica a critério do(a) médico(a) assistente a orientação em relação à perda de uma dose prescrita.

Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Se você esquecer de aplicar a sua dose, entre em contato com o seu médico imediatamente.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE CAUSAR?

Os eventos adversos mais comuns de infliximabe (Remicade®) são infecções respiratórias (como bronquite, sinusite, resfriado), dor, febre, dor de cabeça, náusea, vômito, diarreia, tontura, tosse, erupção cutânea e cansaço. Os motivos mais comuns para os pacientes pararem o tratamento com infliximabe (Remicade®) são porque estes apresentaram uma reação durante a administração, tal como falta de ar, erupções cutâneas e dor de cabeça.

Eventos adversos graves que podem exigir tratamento podem ocorrer durante o tratamento com **REMSIMA® SC**. Os possíveis eventos adversos graves de **REMSIMA® SC** incluem:

Infecções graves

Alguns pacientes, especialmente aqueles com 65 anos ou mais, tiveram infecções graves ao receber infliximabe (Remicade®), incluindo tuberculose e infecções sistêmicas bacterianas, fúngicas e virais. Alguns pacientes morreram devido a essas infecções. O uso de vacinas “vivas” pode resultar em uma infecção causada pelos vírus ou bactérias “vivas” contidas na vacina (quando você tem um sistema imunológico enfraquecido). Se você apresentar febre, cansaço, tosse ou desenvolver sintomas de gripe, ou desenvolver um abscesso, durante ou após receber **REMSIMA® SC**, informe ao seu médico imediatamente, pois estes podem ser sinais de que você está com infecção.

Problemas de pulmão

Alguns pacientes desenvolveram inflamação nos pulmões (como doença pulmonar intersticial) que podem levar a danos permanentes. Você deve informar seu médico se você desenvolver uma falta de ar nova ou piora.

Insuficiência cardíaca congestiva

Se você tem insuficiência cardíaca e iniciou o tratamento com **REMSIMA® SC**, o seu estado de insuficiência deve ser monitorado de perto por seu médico. Se você apresentar novos ou agravamento dos sintomas de insuficiência cardíaca, como falta de ar ou inchaço nos pés, deve contatar o seu médico imediatamente.

Outros problemas no coração

Alguns pacientes tiveram ataque do coração (alguns levando ao óbito), baixo fluxo de sangue para o coração ou ritmo anormal do coração dentro de 24 horas após o início da infusão com infliximabe (Remicade®). Os sintomas podem incluir desconforto ou dor no peito, dor no braço, dor no estômago, encurtamento da respiração, ansiedade, desmaio, tontura, sudorese, náusea, vômito, ritmo alterado ou sensação de aperto no peito, batidas rápidas ou lentas do coração. Contate seu médico imediatamente se você apresentar estes sintomas.

Reações alérgicas

Alguns pacientes têm reações alérgicas graves ao infliximabe. Essa reação pode ocorrer enquanto você estiver começando sua infusão ou pouco depois. Os sintomas de uma reação alérgica podem incluir urticária, dificuldade de respirar, dor no peito e pressão sanguínea alta ou baixa. O seu médico pode decidir diminuir a velocidade ou parar a administração de **REMSIMA® SC** e administrar uma medicação para tratar a reação alérgica.

Algumas reações alérgicas são tardias e foram vistas 3 a 12 dias após o tratamento com infliximabe (Remicade®). Os sintomas desse tipo de reação tardia incluem dor muscular ou nas articulações com febre ou erupção cutânea. Informe ao seu médico se você apresentar qualquer um desses sintomas após o tratamento com **REMSIMA® SC**.

Sintomas semelhantes aos do lúpus

Alguns pacientes tratados com infliximabe (Remicade®) apresentaram sintomas que podem assemelhar-se aos do lúpus. Estes sintomas podem incluir desconforto ou dor prolongada no peito, falta de ar, dor nas articulações, ou uma erupção sensível ao sol nas bochechas ou nos braços. Informe ao seu médico se você apresentar algum desses sintomas. O seu médico irá avaliá-lo(a) e pode decidir interromper o tratamento com **REMSIMA® SC**.

Problemas do Sistema Nervoso

Houve casos em que as pessoas que tomaram infliximabe (Remicade®) desenvolveram graves problemas no sistema nervoso que resultaram em inflamação do nervo do olho, que podem causar alterações na visão (incluindo cegueira), dormência ou formigamento, convulsões, fraqueza nos braços ou pernas. Se você tiver algum desses sintomas, entre em contato com seu médico imediatamente.

Problemas de pele

Alguns pacientes tratados com infliximabe (Remicade®) desenvolveram reações liquenoides (erupção cutânea púrpura avermelhada e/ou prurido como linhas branco-acinzentadas nas membranas mucosas) ou outras erupções cutâneas, incluindo vermelhidão, prurido, descamação da pele e bolhas, que podem ser graves. Pequenos inchaços cheios de pus que podem se espalhar pelo corpo, às vezes acompanhado de febre (pustulose exantemática aguda generalizada), foram relatados em alguns pacientes. Notifique o seu médico se você desenvolver qualquer mudança de pele nova ou piora.

Câncer

Relatos de um tipo de câncer de sangue chamado linfoma em pacientes usando infliximabe ou outros bloqueadores de TNF são raros, mas ocorrem mais frequentemente do que o esperado para as pessoas em geral. Pessoas com artrite reumatoide, doença de Crohn, espondilite anquilosante ou artrite psoriásica tratadas por um longo tempo, principalmente aquelas com doença altamente ativa, podem ser mais propensas a desenvolver linfoma. Cânceres, exceto linfoma, também têm sido relatados. Houve casos de câncer, incluindo os tipos incomuns, em pacientes crianças e adolescentes tomando agentes bloqueadores de TNF, que, por vezes, resultaram em morte. Alguns pacientes que receberam bloqueadores de TNF, incluindo infliximabe (Remicade®), desenvolveram um tipo raro de câncer chamado linfoma de célula-T hepatoesplênica. A maioria desses pacientes era de adolescentes ou adultos jovens do sexo masculino, dos quais a maioria tinha doença de Crohn ou colite ulcerativa ou retocolite ulcerativa. Esse tipo de câncer, geralmente, resulta em morte. Quase todos esses pacientes também receberam medicamentos conhecidos, como a azatioprina ou 6-mercaptopurina em adição aos bloqueadores de TNF. Pacientes com um tipo específico de doença pulmonar chamada Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) podem apresentar aumento do risco de câncer com o tratamento com **REMSIMA® SC**. Se você tem DPOC, discuta com seu médico se **REMSIMA® SC** é adequado para você.

Para crianças e adultos tomando medicamentos bloqueadores de TNF, a chance de ter linfoma ou outro câncer pode aumentar. Você deve informar ao seu médico se teve ou se desenvolver linfoma ou outros cânceres enquanto estiver em tratamento com **REMSIMA® SC**.

Alguns pacientes tratados com infliximabe (Remicade®) desenvolveram certos tipos de câncer de pele. Converse com seu médico se ocorrerem quaisquer mudanças no aspecto da pele ou crescimentos na pele, durante ou após a terapia com **REMSIMA® SC**.

Algumas mulheres com artrite reumatoide em tratamento com infliximabe (Remicade®) desenvolveram câncer de colo de útero. Para algumas mulheres recebendo **REMSIMA® SC**, incluindo aquelas com mais de 60 anos de

idade, seu médico pode recomendar que você faça um acompanhamento regular e contínuo para câncer de colo de útero.

Lesão no fígado

Foram observados casos de pessoas que desenvolveram problemas hepáticos graves tomando infliximabe (Remicade®), alguns fatais. Os sinais de que você poderia ter um problema incluem: icterícia (pele e olhos amarelados), urina de cor marrom-escuro, dor no lado direito do abdome, febre e fadiga intensa (cansaço). Você deve contatar o seu médico imediatamente se apresentar qualquer um destes sintomas.

Hepatite B

O tratamento com agentes bloqueadores de TNF, como **REMSIMA® SC**, pode resultar em uma reativação do vírus da hepatite B em pessoas portadoras desse vírus. Se você tem ou teve hepatite B ou sabe ou suspeita que seja portador do vírus da hepatite B, não esqueça de informar o seu médico sobre isso, pois pode afetar a decisão de iniciar ou continuar o tratamento com **REMSIMA® SC**. Seu médico deve solicitar um exame de sangue para o vírus da hepatite B antes de você iniciar o tratamento com **REMSIMA® SC**.

Problemas no sangue

Em alguns casos, os pacientes tratados com agentes bloqueadores do TNF podem apresentar baixa contagem dos elementos do sangue, incluindo uma diminuição grave do número de células brancas do sangue. Se você apresentar sintomas como febre ou infecções persistentes, sangramento ou hematoma, entre em contato com seu médico imediatamente.

Derrame

Alguns pacientes tiveram derrame dentro de aproximadamente 24 horas do momento da infusão de infliximabe (Remicade®). Contate seu médico imediatamente se você tiver sintomas de derrame, que podem incluir: formigamento ou fraqueza na face, braço ou perna, especialmente quando afeta somente um lado do corpo; confusão repentina, problemas repentinos na fala ou compreensão, problema repentino na visão em um ou ambos os olhos, problemas repentinos para andar, tontura, perda de equilíbrio ou coordenação, ou uma dor de cabeça grave repentina.

Outras

Qualquer medicamento pode ter eventos adversos. Essa não é uma lista completa de eventos adversos. Por favor, informe ao seu médico se sentir qualquer sintoma anormal.

Atenção: este produto é um medicamento que possui nova forma farmacêutica no país e, embora as pesquisas tenham indicado eficácia e segurança aceitáveis, mesmo que indicado e utilizado corretamente, podem ocorrer eventos adversos imprevisíveis ou desconhecidos. Nesse caso, informe seu médico.

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

Em caso de superdose, recomenda-se que os pacientes sejam acompanhados em relação a sinais e sintomas de reações ou efeitos adversos e que seja, imediatamente, instituído tratamento sintomático apropriado.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

DIZERES LEGAIS

MS – 1.9216.0001

Farm. Resp.: Silvia Akemi Kamizaki - CRF-SP nº 25.425

Registrado, Importado e Comercializado por:

Celltrion Healthcare Distribuição de Produtos Farmacêuticos do Brasil Ltda.,
Rua Santo Antônio, 175, Centro, Caieiras-SP
CNPJ 05.452.889/0001-61

REMSIMA® SC (infliximabe) todas as apresentações

Registrado, Importado e Comercializado por:

Celltrion Healthcare Distribuição de Produtos Farmacêuticos do Brasil Ltda.,
Rua Santo Antônio, 175, Centro, Caieiras-SP
CNPJ 05.452.889/0001-61

REMSIMA® SC (infliximabe) em seringa preenchida (com protetor de agulha)

Fabricado por:

Vetter Pharma-Fertigung GmbH & Co. KG, Ravensburg (Schützenstrasse), Alemanha

Embalado por:

Vetter Pharma-Fertigung GmbH & Co. KG, Ravensburg (Mooswiesen), Alemanha

REMSIMA® SC (infliximabe) em caneta aplicadora

Fabricado por:

Vetter Pharma-Fertigung GmbH & Co. KG, Ravensburg (Schützenstrasse), Alemanha

Embalado por:

SHL Pharma LLC, Florida, Estados Unidos da América



VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA.

Esta bula foi aprovada pela ANVISA em 30/11/2022.

VP1-SC

